



# കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളും

(പ്രാബല്യം : 24.12.2022 മുതൽ 28.12.2022 വരെ)



## കാസറഗോഡ് ജില്ല

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം  
പിലിക്കോട്-ഉം ഇന്ത്യ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പും സംയുക്തമായി പുറത്തിറക്കുന്നത്

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ: പിലിക്കോട്/ കെ.എസ്.ഡി.102/2022 | തീയതി: 23/12/2022 |
|--------------------------------------------------|-------------------|

എ. പിന്നിട് നാല് ദിവസത്തെ കാലാവസ്ഥ


| മഴ, മി.മീ | കൂടിയ താപനില, °C | കുറഞ്ഞ താപനില, °C | ആപേക്ഷിക ആർദ്രത, % | കാറ്റിന്റെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ |
|-----------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|
| 0.0       | 32.2 – 33.0      | 17.5 – 21.5       | 54.0 – 96.0        | 0.9 – 1.1                       |

ബി. വരുന്ന അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പ്

| സൂചിക                           | 24-12-2022 | 25-12-2022 | 26-12-2022 | 27-12-2022 | 28-12-2022 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| മഴ, മി.മീ                       | 0          | 0          | 0          | 0.1        | 1          |
| കൂടിയ താപനില, °C                | 35         | 35         | 35         | 35         | 35         |
| കുറഞ്ഞ താപനില, °C               | 20         | 20         | 20         | 20         | 20         |
| കൂടിയ ആപേക്ഷിക ആർദ്രത, %        | 60         | 60         | 60         | 60         | 60         |
| കുറഞ്ഞ ആപേക്ഷിക ആർദ്രത, %       | 30         | 30         | 30         | 30         | 30         |
| കാറ്റിന്റെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          |
| കാറ്റിന്റെ ദിശ, ഡിഗ്രി          | 50         | 50         | 20         | 20         | 20         |
| മേഘ വിന്യാസം, ഒക്ടാ             | 3          | 5          | 4          | 4          | 5          |

സി. കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ

| വിള               | ഘട്ടം                                                                                                                                                                                                                                                                               | പ്രശ്നങ്ങൾ | കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ | ശക്തികുറഞ്ഞ മഴ ലഭിക്കും **                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                     |
|                   | <p>ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറിൽ 15.5മില്ലി വരെ മാത്രം തീവ്രതയുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തികുറഞ്ഞ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.</p> <p>പകൽസമയങ്ങളിൽ കൂടിയ ഊഷ്മാവും (34 °C) രാത്രികളിൽ കുറഞ്ഞതാപനിലയും (23 °C) അനുഭവപ്പെടും.</p> <p>ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ ആർദ്രതയും അനുഭവപ്പെടും (65% നും 95% നും ഇടയിൽ).</p> |            |                     |
| പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ | <p>അന്തരീക്ഷ ആർദ്ര അധികരിക്കുന്നതിനാൽ വിളകളിൽ ചീച്ചൽ, വാട്ടം എന്നിവയ്ക്ക് ഹേതുവായ പൂപ്പൽ രോഗങ്ങൾ അധികരിക്കും. സസ്യഭാഗങ്ങൾക്ക്</p> <p>വാഴ പോലുള്ള മുദുകാണഡവും എളുപ്പത്തിൽ മറിഞ്ഞു വീഴുന്നതുമായ വിളകൾക്ക് താങ്ങുകൾ നൽകി സംരക്ഷിക്കുക</p>                                              |            |                     |

|                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | വീണ്ടുകിടക്കുന്ന തേങ്ങാ, അടക്ക എന്നിവ പൂർണ്ണമായും നീക്കം ചെയ്യുക. രോഗം വന്നു നശിച്ച മരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും മുറിച്ചുമാറ്റി തീയിട്ടു നശിപ്പിക്കണം. |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |
| നെല്ല്              | വിവിധ ഘട്ടം                                                                                                                                  | വാട്ടം<br>                                                                                                                                                                    | ഫ്യൂജിയോൺ (@2 മില്ലി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ) അല്ലെങ്കിൽ നാറ്റിവോ (@ 5 ഗ്രാം 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ) തളിക്കുക.                                                                                                       |
| കുരുമുളക്           | വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ                                                                                                                               | <b>വേരിലെ മീലി മുട്ടകൾ:</b><br>മുപ്പെത്തിയ ഇലകൾ കടും മഞ്ഞ നിറത്തിലാവുകയാണ് ബാഹ്യ ലക്ഷണം. തടത്തിലെ മണ്ണ് നീക്കിയാൽ മീലി മുട്ടകൾ വേരിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണാം.<br> | തടത്തിലെ മണ്ണ് നീക്കിയതിനു ശേഷം തടത്തിൽ ക്ലോർപൈറിഫോസ് കീനാശിനി (രണ്ടു മില്ലി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ) കുതിർക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വള്ളി ഒന്നിന് മുപ്പതു ഗ്രാം വീതം ഫിപ്റോണിൽ തരികൾ വിതറുകയോ ചെയ്യുക.                   |
| കുരുമുളക്           | വിവിധ ഘട്ടം                                                                                                                                  | പൊള്ളു രോഗം<br>                                                                                                                                                             | ഒരുലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് രണ്ടുമില്ലി ഹെക്ലക്നൊണാസോൾ എന്നതോതിൽ കലർത്തി തയ്യാറാക്കി തളിക്കുക                                                                                                                          |
| കുരുമുളക്           | വിവിധ ഘട്ടം                                                                                                                                  | <b>വേരിലെ നിമാവിരകൾ:</b><br>വിളർച്ച, മുരടിപ്പ്, ഇലകൾ മഞ്ഞളിച്ച് സാവധാനം വാടിപ്പോവുക എന്നിവയാണ് ബാഹ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ. ചെടി പിഴുതു നോക്കിയാൽ വേരിൽ വരട്ടു ചൊരിപോലുള്ള തടിപ്പുകൾ കാണാം                                                                                 | മുന്നൊരുക്കമായി ട്രൈക്കോഡെർമ അല്ലെങ്കിൽ പോച്ചോണിയ സംപുഷ്ടമാക്കിയ ചാണക വളം ചേർത്തുകൊടുക്കുക.<br><br>'കാർബോസൾഫാൻ 25 EC' കീടനാശിനി 4 മില്ലി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്നാ തോതിൽ കലർത്തി വള്ളികളുടെ തടത്തിൽ കുതിർക്കുക |
| വെള്ളരി വർഗ്ഗ വിളകൾ | പുഷ്പിക്കുന്ന ഘട്ടം                                                                                                                          | അസാധാരണമായ പൂക്കൊഴിച്ചൽ                                                                                                                                                                                                                                        | 'സൊല്യൂബോർ' 2 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്നാ തോതിൽ കലർത്തി തളിച്ച് കൊടുക്കുക.                                                                                                                                 |

|                   |                                      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| വെള്ളരി വർഗ്ഗ വിള | വളർച്ചാ ഘട്ടം                        | <p>മുദുരോമ പൂപ്പൽ രോഗം</p>                                                                                | വെള്ളരി വർഗ്ഗ വിളകളിൽ മുദുരോമ പൂപ്പൽ രോഗം പടരാൻ സാധ്യത. മുൻ കരുതലായി 'മാങ്കോസെബ്' 2 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ തയ്യാറാക്കി ഇലകളുടെ ഇരു വശത്തും തളിക്കുക. രോഗം കാണുകയാണെങ്കിൽ അക്കോമീൻ 3 മില്ലി. ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന അനുപാതത്തിൽ 15 ദിവസ ഇടവേളകളിൽ മൂന്നു തവണ തളിക്കുക. രോഗബാധിത ഇലകൾ പഠിച്ചെടുത്ത് തീയിട്ട് നശിപ്പിക്കുക |
| പച്ചക്കറികൾ       | വിവിധ ഘട്ടം                          | <p><b>വേരിലെ നിമാവിരകൾ:</b></p> <p>വിളർച്ച, മുരടിപ്പ്, ഇലകൾ മഞ്ഞളിച്ച് സാവധാനം വാടിച്ചോവുക എന്നിവയാണ് ബാഹ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ. ചെടി പിഴുതു നോക്കിയാൽ വേരിൽ വരട്ടു ചൊരിപോലുള്ള തടിപ്പുകൾ കാണാം</p> | മുന്നൊരുക്കമായി ട്രൈക്കോഡെർമ അല്ലെങ്കിൽ പോച്ചോണിയ സംപുഷ്ടമാക്കിയ ചാണക വളം ചേർത്തുകൊടുക്കുക.<br><br>'കാർടാപ്' 2 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ നേർപ്പിച്ച ചെടികളുടെ തടം കുതിർക്കുക                                                                                                                                                   |
| കശുമാവ്           | തളിരിടിയും പൂക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയം | <p>തേയിലകൊതുകും അനുബന്ധ പൂപ്പൽ രോഗങ്ങളും</p>                                                            | കോപ്പർ ഓക്സീ ക്ലോറൈഡ് 3 ഗ്രാം വീതവും എക്കാലക്സ് 2 മില്ലി വീതവും ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ തയ്യാറാക്കിയ ലായനി തളിക്കുക                                                                                                                                                                                                                |
| കശുമാവ്           | വിവിധ ഘട്ടം                          | <p>തടിതുരപ്പൻ</p>                                                                                      | തായ്യിടികളിലും പുറമെ കാണുന്ന വേരുകളിലും ക്ലോർപൈറിഫോസ് 2 മില്ലി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ തയ്യാറാക്കിയ ലായനി പുരട്ടുകയും മണ്ണിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക. 5 വർഷത്തിന് മുകളിൽ പ്രായമായ മരങ്ങളാണെങ്കിൽ ചെളി : ടാർ - മണ്ണെണ്ണ മിശ്രിതം (1:2അനുപാതത്തിൽ) മുൻകരുതലായി കൊടുക്കാവുന്നതാണ്                                                |
| കവുങ്ങ്           | വിവിധ ഘട്ടം                          | <p>വേരിൽ നിമാവിരകൾ</p>                                                                                 | മഞ്ഞളിപ്പ് കാണുന്ന കവുങ്ങിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ (നിമവിരകൾക്ക്) - കാർബോസൽഫാൻ 25 EC 4 മില്ലി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ (ഒരു ചെടിയ്ക്ക് കുറഞ്ഞത് 3 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ) തയ്യാറാക്കി ഒഴിക്കുക                                                                                                                                                      |

\*\*മഴ അപായ വർണ്ണ സൂചന (ദുരന്ത നിവാരണത്തിനായ്)

|                                  |                        |                        |                                  |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|
| താക്കീത്<br>(ഉടൻ നടപടിയെടുക്കുക) | ജാഗ്രത<br>(തയ്യാറാവുക) | ശ്രദ്ധ<br>(കാതോർക്കുക) | നിസ്സാരം<br>(നടപടികൾ ആവശ്യമില്ല) |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|

ഒപ്പ്/-  
നോഡൽ ഓഫീസർ  
ഗ്രാമീണ കൃഷി കാലാവസ്ഥ സേവ പദ്ധതി