



കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല
കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രപഠന വിഭാഗം,
ഹോർട്ടികൾച്ചർ കോളേജ്, വൈള്ളാനിക്കര
Email: cohagmet@kau.in & kauagmet@yahoo.co.in
കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ നിർദ്ദേശക ബുള്ളറ്റിൻ



പാലക്കാർജില്ല

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്ര പഠന വിഭാഗത്തിന്റെയും, ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെയും, കേരള കൃഷി വകുപ്പിന്റെയും സഹകരണങ്ങളാട തയ്യാറാക്കുന്നത്.

എ.എ.എസ് 35/2020(70), വൈള്ളിയാഴ്ച

തീയതി 27.08.2020

അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്കുള്ള കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം:

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ	28.08.2020	29.08.2020	30.08.2020	31.08.2020	01.09.2020
മഴ (മില്ലി.മീറ്റർ)	0.1	0	0	0	5
ഉയർന്ന താപനില (°C)	34	34	34	34	34
കുറഞ്ഞ താപനില (°C)	25	25	25	25	25
കുടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്ദര (%)	93	93	93	93	93
കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്ദര (%)	68	68	68	68	68
കാറ്റിന്ത്യേഖത (കിലോമീറ്റർ/മണിക്കൂർ)	10	10	8	8	6
കാറ്റിന്ത്യേഖത (ഡിഗ്രി) (ഡിഗ്രി)	250	250	250	270	270
മേഘവ്യാപ്തി (ഒക്ട്)	6	6	8	8	8

ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെയും കെ.എ.യുവിന്റെയും പ്രവചനമനുസരിച്ച് ജില്ലയിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത കുറവാണ്.

കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ:

വിളകൾ	രോഗ കീടങ്ങൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ: കാർഷിക വിളകളെ മഴക്കാല രോഗകീടങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി കൃഷിയിടങ്ങളിൽ മതിയായ നീർവ്വാർച്ച സാകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുക.		
നെല്ല് (വിത്ത്) കർണ്ണവരുന്ന പരുവം	ബാക്കിരിയൽ ഇല കരിച്ചൾ	വൈളം കയറിയ പാടഗേവരങ്ങളിൽ ബാക്കിരിയൽ ഇലകൾച്ചിലിന് പ്രതിരോധനപട്ടിയായി 20 ശ്രാം പച്ചപാണകം ഒരു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ കലക്കി തെളിയെടുത്തും 20 ശ്രാം സ്പൂഡോമോണാസ് ഒരുലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ കലക്കിയതും ചേർത്ത് തളിക്കാവുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏക്കർ പാടഗേവരത്തിൽ 100 ശ്രാം വീതമുള്ള 20 കിഴികളിലായി സ്റ്റീച്ചിങ്ങ് പാരയർ നീർച്ചാലുകളിൽ ഇടുക്കാടുക്കാവുന്നതാണ്.
	ചാഴി	നെല്ലിലെ പാഴിയ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരു മി.ലി മാലത്തിയോണ് ഒരു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ തളിക്കുക. (പാഴിക്കെത്തിരെ കീടനാശിനികൾ പ്രയോഗിക്കുന്നത് രാവിലെ 9 മണിക്ക് മുമ്പോ, വൈകീട് 3 മണിക്കു ശേഷമോ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നുത്തി പരാഗണങ്ങൾ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും.)
തെങ്ങ്	പരിചരണം	ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള രാസവള പ്രയോഗത്തിന്റെ രണ്ടാം ഗവു, ജലസേചന സൗകര്യമുള്ള തെങ്ങുകൾക്ക് 550 ശ്രാം യൂം യൂറിയ് 700 ശ്രാം രാജ്ഞോഫാസ് 800 ശ്രാം പൊട്ടാഷ് വിത്തവും മഴയെ ആകുകയിച്ചു തുച്ഛി ചെയ്യുന്ന തെങ്ങുകൾക്ക് 500 ശ്രാം യൂം യൂറിയ് 800 ശ്രാം രാജ്ഞോഫാസ് ഒരു കിലോ പൊട്ടാഷം തെങ്ങാണിന് മട്ട കൊടുക്കാവുന്നതാണ്.
ജാതി	ഇലക്കാഴിച്ചിൽ	ജാതിയിൽ ഇലക്കാഴിച്ചിൽ വരാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലായി ഒരു ശതമാനം വീറുമുള്ള സോർഡോ മിശ്രിതം കലക്കി തളിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്.
ഇണവി	ബാക്കിരിയൽ വാട്ട്	ഇണവിയിൽ കാണുന്ന ബാക്കിരിയൽ വാട്ടത്തിന് പ്രതിരോധനപട്ടിയായി 20 ശ്രാം പച്ചപാണകം ഒരു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ കലക്കിയതും 20 ശ്രാം സ്പൂഡോമോണാസ് ഒരുലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ കലക്കിയതും ചേർത്ത് തളിക്കാവുന്നതാണ്.
പച്ചക്കറികൾ (പയർ)	കരിവള്ളിക്കേട്	പയറിൽ കരിവള്ളിക്കേട് എന്ന രോഗം കാണാൻടയുണ്ട്. പ്രതിവിധിയായി 1% ബോർഡോമിശ്രിതം കലക്കി തളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ ഓക്സിഫോറോഡെഡ് 3 ശ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ കലക്കി തളിക്കുക.
മുസനംരക്ഷണം		• തൊഴുത്തിലും പർസര പ്രദേശങ്ങളിലും വൈളം കെട്ടിനിർക്കുന്നതും, മലിനജലം കെട്ടി നിർക്കുന്നതും, കൊതുകു, ഇംച്ച എന്നിവ പെരുക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കണം.